PROGRAMME PROTECTION VIGNOBLE

	Repos hiver	Pointe verte visible	1ère feuille étalée	2 / 3 feuilles étalées	Boutons floraux agglomérés	Boutons floraux séparés	Début floraison	Floraison	Nouaison	Fermeture de la grappe	Début véraison	Mi-véraison	Fin véraison
Excoriose		soufre 4 kg / ha											
Mildiou				bouillie bordelaise 3,75 kg/ ha	bouillie bordelaise 3,75 kg/ ha	bouillie bordelaise 3,75 kg/ ha	bouillie bordelaise 3,75 kg/ ha	ametoctradine metirame-zinc 2,5 kg/ha	zoxamide +sulfate de cuivre 2,8 l/ha	zoxamide +sulfate de cuivre 2,8 l/ha	hydroxyde de cuivre (500 gr cu métal)	hydroxyde de cuivre (500 gr cu métal)	
ention black rot													
Oïdium				soufre 8kg / Ha	soufre 8kg / Ha	soufre 8kg / Ha	soufre 8kg / Ha	soufre 8kg / Ha	difenoconazole+cyflufenamid 0,5 l/ha	soufre 4kg / Ha			
Oïdium									poudrage au soufre fleur 20 kg / ha				
cicadelle de la flavescence									alphametrine 10 gr de matiere active / ha		tau-fluvalinate 48 gr de matiere active / ha		
Vers de grappes										indoxacarbe 37,5 gr de matiere active / ha			
Nutrition foliaire													
Botrytis													